

1

Rapport d'un mémoire
présenté à l'Académie par M.
maigrot chirurgien
à Ransonnière



Le mémoire a pour objet d'établir —
la nécessité des contreouvertures ^{dans les fractures} des extrémités
compliquées de plaies et d'épanchement de
sang. La nécessité de cette opération porte
sur des preuves de trois genres: 10: le raisonne-
ment 20: les accidents fâcheux qui s'y déter-
minent ~~par~~ ^{par} omission 30: les succès qui sont
constamment suivies

on examine d'abord les accidents divers que
le sang épanché peut occasionner on
parcourt les différentes dépravations dont
on croit ce fluide susceptible. fit le
coagule, dit-on, il suffoque le jeu des
vaisseaux et ralentit le mouvement des
tissus destinés à former le cal. L'auteur suppose
ce ralentissement & ne le prouve pas quant
à nous qui ne connoissons pas le degré de Vitæ

ARC 33 d. 1 n° 16

le plus favorable à la formation du cal,
nous avouons ingénument que le phénomène
des conséquences nous ont paru hasardées.
personne n'ignore que les mouvements violents
du système vasculaire s'opposent à la
réunion des parties molles.

Si le sang se dépose, il attire et imbibes les fibres
opéuses divisées, et les met hors d'état d'élaborer
la matière du cal. nous convenons sans peine
que le sang tombé en décomposition putride
peut altérer les os, mais nous ne convenons pas
qu'il les pénètre et qu'il les imbibes. Je
ne vois rien qui puisse étayer cette
opinion. aussi l'avance-t-on sans preuves.
Le ramollissement des extrémités d'os divisées,
dont quelques praticiens reconnoissent l'existence
n'est pas même favorable à cette assertion.

nous ne dirons pas non plus, comme Paulus,
que dans l'état de ramollissement les fibres
opéuses ne peuvent plus élaborer la matière
du cal. loin de penser que l'élaboration
du suc opéux se fasse dans les extrémités
des fibres opéuses, nous osons au contraire qu'elle

3

n'entrent pour rien dans la préparation
le point d'un vaisseau sécrétoire où une
humour fécondée commencent à se montrer
revêtue de ses propriétés n'est pas celui où
elle a reçu les modifications qui la consti-
tuent formellement telle.

Si le fong se déprave, il corrompt les os. Pautour
aurait dû nous apprendre de quelle espèce
de dépravation il entend parler; car la
disposition putride qu'il a déjà annoncée,
peut très bien produire les effets qu'il
attribue ici à la dépravation vaguement
indiquée. ~~Si l'auteur~~ eût été plus familier
avec les ouvrages des Boerhaave et des
guainer, il nous eût épargné cette légère
animadversion.

La résorption du fong enfin, produit. Dit-on
les divers accidents que les praticiens de tous
les pays et de tous les âges ont attribués aux
reflus des matières purulentes.

Pautour a joint trop les effets du fong
épanché. une observation de M. A. Jervin



est lui propre à calmer les évanouissements.
Le grand chirurgien ouvrit un abcès
à la cuisse, dont il tira 6 livres de sang
qui fit tout conformer l'espace des 40 jours
hors des vaisseaux sans venir à une grande
pourriture: ce sont ses termes. cette observation
qui se trouve à la page 98 de sa médecine
essentielle mérite d'être lue à d'autres égards.
on y voit l'artère crurale ouverte à 2 lignes
de doigt de l'aine, la ligature ~~qui~~
pratiquée avec ^{tant de} succès, que le malade fut
guéri et marcha au bout de six semaines
le maître Jean Trullus voracien arrêtant
le sang pendant l'opération, en pressant
fort l'aine avec les doigts.

Deux observations forment les preuves du
second genre. un homme de 60 ans se
fractura complètement la jambe. le tibia
et le péroné sortirent à travers les chairs.
comme la plaie mouroit les fractures à
découvert dans une grande étendue, on la
cruat saubante. vers le 16.^e jour il survint
une suppuration abondante, mêlée de sang

noir le corrompu. la plaie fut agrandie.
la suppuration continua d'être exquise
la fièvre lente, le marasme et le flux
de ventres emportèrent le malade vers
le 60^e de ses blessures. il est clair, dit
l'auteur, qu'il y avait un épanchement
de sang très décoloré dans le lieu de la fracture
ce sang a dû s'organiser dans la plaie et y
acquiescer des degrés de malignité qui ont
produit chaleur, douleur, suppuration;
la résorption a donné la mort.

Si on faisoit jouer un moins grand rôle
au sang épanché, et qu'on eût un peu
plus égard aux engorgements, aux dépôts
qui suivent les plaies contuses, je verrais
dans cette légère exquise la doctrine de
l'académie.

un jeune homme eut la cuisse fracturée
avec plaie considérable. la dissection
fut agrandie heurt le bas. des accidents
survenus le 15^e obligèrent d'étendre les
dilatactions. les accidents se calmaient, mais



ils reparurent lors que les matieres
purulentes se furent accumulées dans le
fond de la plaie. des bandages excrucians
en procurerent l'évacuation. enfin après
huit mois le malade fut guéri d'une légère
claudication prise, et une anthraxe au genou
qui céda à la douche des eaux de Bourbonne.

L'auteur voit partout le sang épanché
se ne voit que lui. on ne peut douter, dit-il
que le sang épanché se retenu faute d'un
libre écoulement n'ait été seul toute la part
aux accidents qui exposèrent plus d'une
fois la vie du malade. nulle autre cause
ne peut y concourir. Comment peut-on ne
voir que le sang épanché dans des plaies
contuses telles que celles que je viens de
décrire. m. meignot le fait après devant
les yeux. ce voile l'empêche de voir les
continuelles irritations produites par les
aspérités des os, les brides, les étranglements
les inflammations énormes. & il s'occupe
si peu de ces choses, que lors même qu'il parle

7
des dilations, ce n'est jamais que l'adivision
accidentelle étendue dans un sens ou dans un
autre. Dans tout son mémoire, il ne se trouve
pas un mot qui annonce qu'il ait fait
attention aux brides internes, ni aux accidents
qu'elles entraînent après elles. Vous avez entendu
m^{rs} que les doctes dissipèrent l'an kistose
on conclut de ces deux observations que
les contrecouvretures sont absolument nécessaires
lorsque la plaie ne favorise pas l'évacuation
des matières purulentes. quoique la solidité
de cette conclusion entraîne tous les suffrages,
l'auteur va la fortifier par des succès.

un homme lut la cuisse. Capie avec
célac a sa partie moyenne. un fragment
des fémurs de trois pouces de long, comprenant
tout son diamètre fut entièrement séparé de
son corps. la même cause avait fracturé les
deux os des jambes au dessus des malléoles
les chairs de la jambe étoient divisées circu-
lairement, de sorte que le segment supérieur
ne tenoit à l'inférieur ^{que} par les gros vaisseaux
et le tendon d'achille. la plaie de la cuisse



était placée à sa partie antérieure on
fit d'abord l'extraction de l'esquille. Et
on ouvrit immédiatement après une
contreouverture à la partie latérale externe
de trois travers de doigt de longueur. Les
mêmes fanons continuèrent les deux fractures
les os de la cuisse commencèrent à se souder
vers le 4.^e mois. au onzième le malade
faisoit exécuter quelques légers mouvements
à cette extrémité. il étoit survenu dans les
premiers trois quatre abcès à la cuisse dont
aucun ne communiquoit avec les fractures
la jambe étoit guérie au 4.^e mois. après
un an le malade marchoit à la faveur des
deux béquilles et d'un talon fort exhaussé.
une seconde chute faite au 16.^e mois recassa
la cuisse au même endroit. la fracture fut
simple et la guérison prompte. cet homme
marche aujourd'hui pendant un quart d'heure
sans appui. les cicatrices gênent les mouvements
des muscles, et tiennent la jambe légèrement
fléchie. l'auteur fait ces plus grands efforts
pour montrer dans cette observation les

9
bien faits des contreouvertures. il parait ^{en}
craindre que les dépôts survenus n'affoiblis-
sent le mérite. aussi ne néglige t-il rien
pour prouver qu'ils doivent leur existence
à des fentes en los, qu'il soupçonne et ~~n'est~~ ^{déclare}
pas. nous voyons que s'ils eussent reconnu
la cause que l'auteur leur assigne, ils-
auraient communiqué au lieu où les fentes
proviennent naissance, et l'histoire de la
maladie nous apprend qu'aucun d'eux
ne communiqua avec le vuide de la
fracture

un jeune homme lut l'avant-bras fracturé
par une roue de moulin. en se dégageant
avec effort il tomba, et se cassa le bras
du même côté. cette dernière fracture
était simple, on la content par un
bandage roulé. celle de l'avant bras offroit
une plaie, des esquilles, et deux os cassés. la
plaie fut agrandie, une contreouverture
pratiquée, et le bandage à ses chefs
appliqué. on arrosa l'appareil d'eau
de vie animée par le camphre et le sel.
ammoniac.



on fit trois saignées. il survint gonflement
accompagné de phlicènes. le 3.^e jour il
sortit une palette de sang par les contouvertures
les plaies étant auparavant cicatrisées le
16.^e jour le bandage roulé fut substitué
au bandage à res chefs. le malade
fut guéri au bout de 6 mois. des réflexions
sur le fruit de la contouverture dans ce
cas-ci firent cette observation; mais elles
ne contiennent rien qui n'ait été dit dans
les premières pages de la mémoire. nous
ne reprocherons pas à M^r. Maigrot -
l'usage primitif de l'eau de vie camphrée
en premier appareil dans un cas où tant
de parties propres à former des tronç-
nements gangreneux étoient ou contusés
ou déchirés. c'est un vieux préjugé
que l'Académie combat depuis longtemps,
et qu'elle auroit déjà decacimé si les
hommes étoient moins attachés à la
routine, et moins fournis de l'empire de
l'habitude. D'ailleurs, tel est le malheur
des chirurgiens de ~~leur~~ provinces, dit

un chirurgien de Lyon, éloigné du
Centre de lumière nous ne jouissons des
découvertes qui émanent de l'acad. G. Del.
qu'après ^{un très grand nombre de fois} long temps et notre satisfaction

L'auteur qui voit dans ces quatre observations
l'épanchement sanguin comme unique cause
des accidents, s'est appliqué à rassembler les signes
qui le caractérisent. écartons-les lui-même
Les épanchements sont en général plusieurs-
» jours à se manifester, et commencent ordinairement
» par une impression de chaleur la-
» de douleur fourde. les chairs des environs de
» la plaie se tuméfient et deviennent édemateuses.
» l'édème s'étend peu à peu et occupe
» insensiblement toute la partie. la plaie
» paroît peu animée. des frissons et des-
» mouvements de fièvre se font de temps en temps
» appercevoir. c'est après dans les mêmes-
termes que nous trouvons décrits dans ces
ouvrages de chirurgie les signes avant
coureurs et préparatoires d'une abondante
suppuration. aucun trait dans ce tableau ne
caractérise spécialement les dépôts sanguins.



toutes les fractures dont les plaies sont mal
situées exigent-elles une contreouverture, il
est facile de répondre, c'est toujours l'auteur
qui parle, qu'on ne doit pas pratiquer que
lors qu'il y a un épanchement décidé. C'est
trop bonne l'usage des contreouvertures - elles
seront encore nécessaires toutes les fois qu'on
aura des étranglements considérables &
vains, des suppurations abondantes &
attendues, des convulsions à écarter ou à
combattre.

est-il plus avantageux dans le cas d'épanchem^t
de recourir d'abord à la contreouverture ou de
différer jusqu'à ce que les accidents marquent
la nécessité de la pratiquer? L'auteur se décide
pour la contreouverture faite dans le premier
cas à cause de la facilité avec laquelle
le sang épanché se corrompt. nous admettons
la décision de l'auteur, sur des motifs que nous
croions plus solides que la corruptibilité du sang.
les plaies déchirées et contuses des fractures qui
interceptent des parties tendineuses, ligamenteuses,
aponeurotiques ont tant de rapport avec les
plaies d'armes à feu, que le traitement de celles-ci

leur conviennent presque à tous égards.
ce parallèle montre notre façon de penser
au sujet des contrecouvertures dans les-
fractures avec ^{délablement} ~~grande~~ considérable.

La cinquième observation est destinée à
montrer qu'il se fait des épanchements entre
le périoste et l'os. les meilleurs écrivains en chir-
urgie attribuent les accidents sur les quels on
fonde cette opinion au déchirement et à la suppu-
ration des têtes médullaires qui tapissent les
cavités des os longs et à la disposition putride
de la moëlle.

La 6, 7, et 8 observation offrent des fractures
obliques compliquées de plaies considérables quoique
les contrecouvertures aient été pratiquées, l'auteur
ne les considère ici qu'accidemment il propose
principalement des moyens de réduire et de
contenir cette espèce de fractures. il propose
une machine avec laquelle il a rempli
deux indications. ^{mais} ~~je~~ ne ferons pas la
description; elle a été sous les yeux de
l'Académie. Cependant, chargés de l'apprécier



nous dirons 10: quelle ressemble le plus au coup
au gloscome d'hyppocrate, gravé dans
oribase pag: 166 de la belle collection
de henri etienne. on la croiroit Calquée
sur cette machine antique. 20: quelle n'en
diffère qu'en ce que le gloscome fait des
extinctions actives, en portant réellement la
partie supérieure du membre vers le tronc,
pendant qu'il en éloigne l'inférieure, au lieu
que celle-ci ne fait que fixer la partie supé-
rieure du membre pendant que l'inférieure
est écartée. 30 que cette machine a tous les
les défauts du gloscome. nous ne répéterons
pas ici les raisons qui ont fait abandonner
la machine d'oribase 40: enfin que le second
chassis ajouté au gloscome, destiné
à retenir l'extrémité dans la situation la
plus favorable ^{est une addition avantageuse} dont on sentira aisément
l'utilité lors qu'on fera usage de la machine
nous croyons avoir renfermé dans ce parallèle
la juste appréciation du gloscome de m. maigrot

les vûes de ce memoire sont justes. ^{mais portées} la
Wgs loin récipite des contrecouvertures y est établie
par les faits. quoique son auteur ne
soit pas exact dans la théorie, sa pratique
est ordinairement bonne. ^{cependant il n'y a que trop} les observations
les principes généraux
qu'il renferme sont, pour la plus part,
intéressantes. Le memoire doit certifier l'acad-
emie y trouvera des matieres lorsqu'elle
traitera la matiere des fractures.

Le 11.^e mai 1769 Dupouy Lajurieu



[Faint, illegible handwriting, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is mirrored and difficult to decipher.]